Nom : Roger Prénom: Mathis colle du: 18_03_24

	niveau de maîtrise	poids compétence	note compétence	note globale
Savoir énoncer les résultats importants du cours	1	10	5,0	10,0
Connaître les hypothèses d'application des résultats	1			
Savoir appliquer directement son cours sur un exemple simple	1			
S'approprier : faire un schéma, identifier les grandeurs physiques et les hypothèses	NE	6	3,0	
Analyser : adapter l'écriture des relations, théorèmes ou principes à la situation proposée	NE			
Réaliser : Savoir mener les calculs analytiques, numériques, résolutions d'équations	1			
Valider : Vérifier la pertinence du résultat obtenu (critique de la valeur et de sa dimension)	NE			
Communiquer à l'oral dans un langage courant, scientifique et approprié	1	4	2,0	
Rédiger proprement ses démarches au tableau	1			

	+	-		
ajustement		*	note	9

Remarques : Exo 1 : Il faut chercher à gagner en rapidité de traitement des questions

Colle Stéphane : Exercice 1 :

Un point matériel M , de masse m , est assujéti à se déplacer sans frottement sur un plan horizontal percé en O . A travers O passe un fil souple inextensible, dont une extrémité est tenue par un opérateur. Le point M décrit des cercles de rayon $r = OM$ autour de O à la vitesse angulaire ω .

- Dresser le bilan des forces subies par M et calculer le moment $\vec{M}_O$ de leur résultante en O
- En utilisant le théorème du moment cinétique, montrer que le moment cinétique $\vec{L}_O$ de M en O demeure constant.
- Dans une base cylindro-polaire $(\vec{e}_r, \vec{e}_\theta, \vec{e}_z)$ déterminer les composantes de $\vec{L}_O$
- L'opérateur agit sur le fil de manière à faire passer la longueur OM de r_0 à $\frac{r_0}{2}$; la vitesse angulaire passe concomitamment de ω_0 à ω_1 . Déterminer ω_1 en fonction de ω_0 .

Exercice 2

- La Terre, de masse M_T , est supposée être en orbite elliptique autour du soleil de masse M . Soleil et Terre seront assimilés à des objets ponctuels et on note r la distance entre le soleil (supposé fixe) et la Terre
 - Exprimer l'énergie mécanique de la Terre en fonction des seules variables r et $\dot{r}$
 - On note r_a et r_p les distances radiales respectivement maximale (aphélie) et minimale (périhélie) entre la Terre et le soleil. En utilisant la conservation de l'énergie, donner l'expression de r_a et r_p .
 - Exprimer l'énergie mécanique de la Terre en fonction de demi-grand axe a de l'ellipse, M , M_T et G (la constante gravitationnelle)

Exercice 1

La tension du fil possède un moment nul et le mouvement plan impose un moment de la force résultante nul. On a donc conservation du moment cinétique et $r^2\omega$ est constant. Donc :

$$r_0^2 \omega_0 = \frac{r_0^2}{4} \omega_1 \text{ soit } \omega_1 = 4\omega_0$$

Exercice 2 :

$$E_m = \frac{1}{2} M_T \dot{r}^2 + \frac{L_0^2}{2M_T r^2} - \frac{GM_T M}{r} = Cte \text{ et pour l'aphélie et la périhélie on a pas de vitesse radiale, donc :}$$

$$E_m = \frac{L_0^2}{2M_T r_{a,p}^2} - \frac{GM_T M}{r_{a,p}} = Cte$$

$$\text{Soit } r^2 \dot{a}_{r,p} + \frac{GM_T M}{E_m} \dot{a}_{r,p} - \frac{L_0^2}{2M_T E_m} = 0$$

$$\text{Et donc } 2a = r_a + r_p = - \frac{GM_T M}{E_m}$$

On retrouve une expression analogue à celle d'un mouvement circulaire : $E_m = - \frac{GM_T M}{2a}$

Nom : Claveau Prénom: Scott colle du: 21-01-24

	niveau de maîtrise	poids compétence	note compétence	note globale
Savoir énoncer les résultats importants du cours	2	10	6,7	10,5
Connaître les hypothèses d'application des résultats	1			
Savoir appliquer directement son cours sur un exemple simple	1			
S'approprier : faire un schéma, identifier les grandeurs physiques et les hypothèses	NE	6	3,0	
Analyser : adapter l'écriture des relations, théorèmes ou principes à la situation proposée	NE			
Réaliser : Savoir mener les calculs analytiques, numériques, résolutions d'équations	1			
Valider : Vérifier la pertinence du résultat obtenu (critique de la valeur et de sa dimension)	NE	4	1,0	
Communiquer à l'oral dans un langage courant, scientifique et approprié	1			
Rédiger proprement ses démarches au tableau	0			

	+	-		
ajustement	*		note	12

Remarques : Tu as obtenu le résultat de Fresnel en complexe, maintenant il faut savoir utiliser cette relation => on avance mais il faut vraiment gagner en rigueur de rédaction

Exercice 1 - Optique ondulatoire

On considère deux trous sources, situés respectivement en O_1 et O_2 . Ces trous émettent respectivement deux ondes parfaitement cohérentes de la forme $a_1(M,t) = A \cos(\omega t - k_0(O_1M))$ et $a_2(M,t) = A \cos(\omega t - k_0(O_2M))$.

- 1) Montrer que l'éclairement en M est donné par $\epsilon(M) = 2\epsilon_0(1 + \cos(\Delta\phi))$. On cherchera à exprimer $\Delta\phi$ en fonction des seules données de cette question.
- 2) Avec le dispositif des trous d'Young, on obtient la figure suivante :

- a) Dessiner le dispositif expérimental. On donnera surtout le positionnement des trous
- b) Comparer l'éclairement calculé à la question précédente avec la figure ci-dessus.
- c) Montrer que la figure ci-dessus (document 5) permet d'estimer les valeurs de la longueur d'onde λ_0 et le diamètre b des trous. On note $D = 1m$ la distance entre les trous et le plan d'observation, $a = 0,5mm$ la distance entre les trous.

Activité : Démarche expérimentale

Au cours d'une conférence présentant l'iPhone 4 et son écran **Rétina**, Steve Jobs a affirmé que «le nombre de pixels des écrans **Rétina** permet de satisfaire la résolution limite de l'œil lorsqu'on regarde un écran à 10 pouces».

Proposer puis réaliser un protocole permettant de valider cette affirmation de Steve Jobs. (On rappelle qu'un pouce = 2,54 cm).

Exercice 1 - Optique ondulatoire

L'éclairement $\epsilon(M)$ en point M est donné par $\epsilon = k_0(O_1M) \times k_0(O_2M)$
 $\epsilon = k_0A_1^2 + k_0A_2^2 + 2 \cos\left(\frac{\Delta\phi}{2}\right) = 2\epsilon_0(1 + \cos(\Delta\phi))$
 Avec $\Delta\phi$, qui est la différence de phase entre les deux rayons, tel que $\Delta\phi = \frac{2\pi}{\lambda_0}d(x)$ et ϵ_0 l'éclairement d'une source prise isolément.
 Afin de minimiser les incohérences, on effectue la mesure de 19 interférences qui occupent $L=1,50m$.
 En utilisant directement $\lambda = \frac{v}{f}$ on obtient $\lambda \approx 5 \times 10^{-7}m$.
 La formule de la diffraction par un trou permet d'obtenir θ en repérant l'annulation du cosinus de la figure
 d'interférence : $\theta_{diff} \approx 0,61 \frac{\lambda}{a}$
 Soit $\theta \approx 0,61 \times \frac{5 \times 10^{-7}}{0,5 \times 10^{-3}} = 0,61 \times 10^{-4} rad$ (avec cette 2^e expression, il n'est pas utile d'utiliser l'échelle)

on obtient $\theta \approx 0,61 \times 10^{-4} rad$
activité - Démarche expérimentale
 1^{re} étape : La résolution angulaire de l'œil est typiquement de l'ordre de $10^{-5} rad$ (1mm pour 1m)
 2^e étape : A 10 pouces de l'écran soit 25,4cm, on doit apprécier au moins un pixel, ce qui fixe sa dimension supérieure à $2,54 \mu m$
 3^e étape : On réalise l'expérience suivante en incidence normale avec un laser VERT intense :

On obtient sur la caméra CCD :

En incidence normale : $a \sin \theta_p = p \lambda$
 Et : $a \sin \theta_{p+m} = (p+m) \lambda$

Sur le capteur, on a $\sin(\theta_p) \approx \frac{p \lambda}{a}$ et $\sin(\theta_{p+m}) \approx \frac{(p+m) \lambda}{a}$
 Donc $\Delta x = m \frac{\lambda D}{a}$
 On mesure alors $a = 74 \mu m$
 5^e étape : Vérification
 Ce résultat est cohérent car il prévoit 6400 pixels : la doc de l'iPhone prévoit 5500 pixels

Nom : Pastouri Prénom: Alix colle du: 01-10-24

	niveau de maîtrise	poids compétence	note compétence	note globale
Savoir énoncer les résultats importants du cours	1	10	3,3	5,5
Connaître les hypothèses d'application des résultats	1			
Savoir appliquer directement son cours sur un exemple simple	0			
S'approprier : faire un schéma, identifier les grandeurs physiques et les hypothèses	NE	6	0,0	
Analyser : adapter l'écriture des relations, théorèmes ou principes à la situation proposée	NE			
Réaliser :Savoir mener les calculs analytiques, numériques, résolutions d'équations	0			
Valider : Vérifier la pertinence du résultat obtenu (critique de la valeur et de sa dimension)	NE	4	2,0	
Communiquer à l'oral dans un langage courant, scientifique et approprié	1			
Rédiger proprement ses démarches au tableau	1			

ajustement

+	-		
*		note	7

Remarques : Mise en équation très compliqué de la relation => il faut reprendre des automatisme de calcul

Colle1

Exercice 1 : Optique ondulatoire (le cours)

On considère deux trous sources, situés respectivement en O_1 et O_2 . Ces trous émettent respectivement deux ondes parfaitement cohérentes de la forme $a_1(M,t) = A \cos(\omega t - k_0(O_1M))$ et $a_2(M,t) = A \cos(\omega t - k_0(O_2M))$. Montrer que l'éclairement en M est donné par $\mathcal{E}(M) = 2\mathcal{E}_0(1 + \cos(\Delta\phi))$. On cherchera à exprimer $\Delta\phi$ en fonction des seules données de cette question.

Exercice 2 : Interférence entre ondes cohérentes d'amplitude différente

On considère l'interférence entre deux ondes cohérentes émises par le dispositif des trous d'Young plongés dans l'air assimilé à du vide. Ces trous n'ont pas tout à fait la même taille ce qui se traduit par une amplitude maximale différentes pour les deux vibrations lumineuses qui seront notées respectivement A et rA avec $0 < r \leq 1$.

- Tracer le graphe donnant le contraste C en fonction de r
- Pourquoi cherchons-nous à faire interférer des vibrations de même d'amplitude ? Commenter pour $r \geq 0,5$

Exercice 3 : Optique ondulatoire (notion de déphasage)

On considère le dispositif suivant travaillant avec des rayonnements monochromatiques (de longueur d'onde λ)

On utilise un déphaseur afin d'obtenir un éclairement nul en $x = 0$ pour celui associé à l'étoile située à l'infini sur l'axe optique du système. L'ordre zéro ayant été décalé d'une demi-interfrange. Quelle est la différence de marche entre deux rayons provenant de la planète située à l'infini mais en dehors de l'axe optique ?

Exercice 1 : Optique ondulatoire

L'éclairement $\mathcal{E}(M)$ au point M est donné par $\mathcal{E} = K a_0^2(M) \times g^*(M)$

$$\mathcal{E} = K A_0^2 + K A_0^2 + 2 \cos\left(\frac{2\pi}{\lambda_0} \delta\right) = 2\mathcal{E}_0(1 + \cos\Delta\phi)$$

Avec $\Delta\phi$, qui est la différence de phase entre les deux rayons, tel que $\Delta\phi = \frac{2\pi}{\lambda_0} \delta(x)$ et $\mathcal{E}_0$ l'éclairement d'une source prise isolément.

Exercice 2 : Interférence entre ondes cohérentes d'amplitude différente

Il faut reprendre toute la démonstration avec :

$$a_1(M) = A e^{-i k_0 r_1} \quad \text{et} \quad a_2(M) = r A e^{-i k_0 r_2}, \text{ donc l'éclairement est donné par :}$$

$$\mathcal{E}(M) = K(A^2 + r^2 A^2 + 2r A^2 \cos\Delta\phi)$$

$$\mathcal{E}_{\max} = K A^2 (1 + r)^2 \quad \text{et} \quad \mathcal{E}_{\min} = K A^2 (1 - r)^2$$

$$\text{Soit un contraste donné par } C = \frac{2r}{1+r^2}$$

Le contraste est donc maximal lorsque l'on fait interférer des ondes de même amplitude. C'est ce qui est recherché dans le cas des interférences à N ondes.

On pourra noter cependant que passé $r = 0,5$ les fluctuations du contraste sont minces.

Exercice d'optique

On a un déphaseur de π et la différence de marche totale est $\delta = \frac{\lambda}{2} - S_2 S_1 \alpha$