

Nom : Largeaud Prénom: Enzo colle du: 19_09_24 au lieu du 30-09

	niveau de maîtrise	poids compétence	note compétence	note globale
Savoir énoncer les résultats importants du cours	2	10	10,0	19,0
Connaître les hypothèses d'application des résultats	2			
Savoir appliquer directement son cours sur un exemple simple	2			
S'approprier : faire un schéma, identifier les grandeurs physiques et les hypothèses	NE	6	6,0	
Analyser : adapter l'écriture des relations, théorèmes ou principes à la situation proposée	2			
Réaliser :Savoir mener les calculs analytiques, numériques, résolutions d'équations	2			
Valider : Vérifier la pertinence du résultat obtenu (critique de la valeur et de sa dimension)	NE	4	3,0	
Communiquer à l'oral dans un langage courant, scientifique et approprié	1			
Rédiger proprement ses démarches au tableau	2			

	+	-		
ajustement			note	19

Remarques : Très bien pour l'exo de type centrale tritherme

Exercice 2 : Tritherme

Au début du XIX^e siècle, des procédés d'obtention de froid artificiel ont vu le jour. La première machine à atteindre une importance industrielle généralisée fut celle du français Ferdinand Carré qui, en 1859, déposa un brevet pour un réfrigérateur à absorption utilisant l'ammoniac comme fluide frigorigène. Son principe est schématisé figure 1.




Figure 1

Une réfrigérateur à absorption est un récepteur thermique fonctionnant par contact avec trois « thermostats », sans recevoir de travail mécanique. La source chaude à la température T_1 est constituée par le système de chauffage de la machine (un brûleur par exemple). La source tiède à la température T_2 est constituée par la salle dans laquelle se trouve la machine. La source froide à la température T_3 est constituée par l'ensemble à refroidir. On a $T_1 > T_2 > T_3$.

On désigne par Q_1 , Q_2 et Q_3 les transferts thermiques reçus par le fluide au cours d'un cycle de la machine, respectivement lors des contacts avec les sources chaude, tiède et froide.

Q 2. Déterminer les signes des transferts thermiques Q_1 , Q_2 et Q_3 .

Q 3. Comparer les valeurs absolues $|Q_1|$ et $|Q_2|$. Commenter.

Q 4. Définir le coefficient de performance (noté COP) de cette machine et donner son expression littérale.

Q 5. En utilisant les deux principes de la thermodynamique sur un cycle, montrer que $COP < COP_{max}$. On exprimera COP_{max} en fonction de T_1 , T_2 et T_3 .

Q 6. Étudier la limite de COP_{max} lorsque la température T_1 du système de chauffage de la machine devient très grande. Interpréter l'expression obtenue.

Q 7. Quel avantage de ce type de machine peut-on prévoir par rapport à une machine à compression de fluide ?

À partir de 1885, le système à compression de vapeurs liquéfiables commença à prendre le net avantage qui est devenu éminent au cours du XX^e siècle.

2) Le sujet évoque un chauffage de la source chaude $Q_1 > 0$ et la machine cherche à refroidir la source froide $Q_3 > 0$ car on prélève des calories au milieu à refroidir. D'après le premier principe : $Q_2 = -(Q_1 + Q_3) < 0$

3) Toujours d'après le 1^{er} pp : $|Q_2| = Q_1 + Q_3 > Q_1$

4) Le COP est le coefficient de performance, il traduit l'efficacité de la machine à refroidir la source froide à partir du transfert couteux Q_3 :

$$COP = \frac{Q_3}{Q_1}$$

5) L'écriture des deux principes donnent :

$$Q_1 + Q_2 + Q_3 = 0 \Rightarrow \frac{Q_1}{T_1} + \frac{Q_2}{T_2} + \frac{Q_3}{T_3} = -S_c$$

$$COP = -\frac{Q_3}{Q_2} = -\frac{1}{1 + \frac{Q_2}{Q_3}}$$

Et : $-\frac{(Q_2 + Q_3)}{T_2} + \frac{Q_2}{T_2} + \frac{Q_3}{T_3} = -S_c$

Soit : $Q_2 \left(\frac{1}{T_2} - \frac{1}{T_1} \right) + Q_3 \left(\frac{1}{T_3} - \frac{1}{T_1} \right) = -S_c \Rightarrow \frac{Q_2}{Q_3} = -\frac{S_c}{\left(\frac{1}{T_3} - \frac{1}{T_1} \right)}$ posons $\left(\frac{Q_2}{Q_3} \right)_{max} = -\frac{\left(\frac{1}{T_2} - \frac{1}{T_1} \right)}{\left(\frac{1}{T_3} - \frac{1}{T_1} \right)} < 0$

$$\frac{Q_2}{Q_3} = -\frac{S_c}{Q_3} + \frac{Q_2}{Q_3} < \left(\frac{Q_2}{Q_3} \right)_{max} < 0$$

$$COP_{max} = \frac{1}{\left| \left(\frac{Q_2}{Q_3} \right)_{max} \right|} - 1$$

Donc : $COP \leq COP_{max}$ Avec : $COP_{max} = -\frac{1}{1 - \frac{\left(\frac{1}{T_2} - \frac{1}{T_1} \right)}{\left(\frac{1}{T_3} - \frac{1}{T_1} \right)}} = -\frac{\left(\frac{1}{T_3} - \frac{1}{T_1} \right)}{\left(\frac{1}{T_2} - \frac{1}{T_1} \right)}$

6) Si $T_1 \gg T_2 \gg T_3$: $COP_{max} \approx -\frac{\left(\frac{1}{T_3} - \frac{1}{T_1} \right)}{\left(\frac{1}{T_2} - \frac{1}{T_1} \right)} \approx \frac{T_3}{T_2 - T_3}$: on retrouve le COP d'un frigo, le système de chauffage jouant l'équivalent d'un travail

7) Le gros avantage est que sans travail électrique, pas de fil !

Nom : Servant Prénom: Thilbault colle du: 19_09

	niveau de maîtrise	poids compétence	note compétence	note globale
Savoir énoncer les résultats importants du cours	2	10	8,3	13,5
Connaître les hypothèses d'application des résultats	2			
Savoir appliquer directement son cours sur un exemple simple	1			
S'approprier : faire un schéma, identifier les grandeurs physiques et les hypothèses	NE	6	3,0	
Analyser : adapter l'écriture des relations, théorèmes ou principes à la situation proposée	NE			
Réaliser :Savoir mener les calculs analytiques, numériques, résolutions d'équations	1			
Valider : Vérifier la pertinence du résultat obtenu (critique de la valeur et de sa dimension)	NE	4	2,0	
Communiquer à l'oral dans un langage courant, scientifique et approprié	1			
Rédiger proprement ses démarches au tableau	1			

	+	-		
ajustement	*		note	15

Remarques : exo1 : OK, exo2 : Ok, exo 3 : étourderies à la fin

Exercice 1 : Cours sur les lois de Laplace


- Rappeler les hypothèses permettant d'utiliser les lois de Laplace
- On donne une des lois de Laplace $pV^\gamma = Cte$. Retrouver les deux autres.
- Comparer, dans un diagramme de Clapeyron, une compression isotherme et une compression adiabatique mécaniquement réversible d'un gaz parfait.

Exercice 1 : Cours sur les lois de Laplace

- Relation applicable pour un gaz parfait subissant une transformation adiabatique et mécaniquement réversible
- $TV^{\gamma-1} = Cte$ et $p^{1-\gamma}T^\gamma = Cte$
- On a :


Exercice 2 : Application des lois de Laplace

On considère une compression adiabatique et mécaniquement réversible d'un gaz parfait initialement à une température de 300 K. Sa pression passe de 1 bar à 10 bar, calculer la température du gaz en fin de compression. On prendra le coefficient isentropique $\gamma = 1,5$ et $10^{1/3} \approx 2$



Exercice 3 : Moteur et loi de Laplace

On considère le moteur dont l'agent thermique décrit le cycle ci-contre. Les transformations sont des isobares ou des adiabatiques mécaniquement réversibles



- Identifier le sens de parcours du cycle. Justifier
- Identifier la nature des 4 transformations dans ce cycle
- Donner l'expression du transfert thermique Q_c au contact du thermostat chaud en fonction des températures T_2 et T_3 . Le système considéré est une mole de gaz parfait de coefficient isentropique γ .
- Donner l'expression du transfert thermique Q_f au contact du thermostat froid en fonction des températures T_1 et T_4 . Le système considéré est une mole de gaz parfait de coefficient isentropique γ .
- En déduire l'expression du rendement η en fonction des températures du cycle.
- Montrer qu'il est possible d'exprimer ce rendement en fonction des pressions P_1 et P_2
- AN si $\gamma = 1,5$ et $\frac{P_2}{P_1} = 10$ et on donne $10^{1/3} \approx 2$
- Donner l'expression du rendement de Carnot η_c
- On a $\eta < \eta_c$ pourquoi ?

Exercice 2 : Application des lois de Laplace

L'application de la loi de Laplace donne $T_3 = T_2 \left(\frac{P_2}{P_1}\right)^{\frac{1-\gamma}{\gamma}} \approx 600K$

Exercice 3 : Moteur et loi de Laplace

Les transformations sont des isobares ou des adiabatiques mécaniquement réversibles

- Sens horaire pour que $W < 0$
- 1-2 compression adiabatique, 2-3 chauffage isobare, 3-4 détente adiabatique ; 4_1 refroidissement isobare
- $Q_c = \frac{R\gamma}{\gamma-1} (T_3 - T_2)$
- $Q_f = \frac{R\gamma}{\gamma-1} (T_1 - T_4)$
- $\eta = 1 + \frac{(T_3 - T_2)}{(T_1 - T_4)}$
- $\eta = 1 - \left(\frac{P_2}{P_1}\right)^{\frac{1-\gamma}{\gamma}}$
- $\eta = 0,5$
- $\eta_c = 1 - \frac{T_f}{T_c}$
- On a $\eta < \eta_c$ car les isobares sont irréversibles.

Nom : Lonet Prénom: Paul colle du: 19-09

	niveau de maîtrise	poids compétence	note compétence	note globale
Savoir énoncer les résultats importants du cours	2	10	10,0	#DIV/0!
Connaître les hypothèses d'application des résultats	2			
Savoir appliquer directement son cours sur un exemple simple	2			
S'approprier : faire un schéma, identifier les grandeurs physiques et les hypothèses	NE	6	3,0	
Analyser : adapter l'écriture des relations, théorèmes ou principes à la situation proposée	1			
Réaliser :Savoir mener les calculs analytiques, numériques, résolutions d'équations	1			
Valider : Vérifier la pertinence du résultat obtenu (critique de la valeur et de sa dimension)	NE	4	#DIV/0!	
Communiquer à l'oral dans un langage courant, scientifique et approprié	NE			
Rédiger proprement ses démarches au tableau	NE			

	+	-		
ajustement		*	note	#DIV/0!

Remarques : ABS